

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新ルル A ゴールド s
2	成分・分量	9錠中 クレマスチンフル酸塩 1.34mg、ベラドンナ総アルカロイド 0.3mg、 プロムヘキシン塩酸塩 12mg、アセトアミノフェン 900mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、 ノスカピン 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、 ベンフォチアミン(ビタミン B ₁ 誘導体) 24mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用して下さい。 成人(15歳以上):3錠 12歳以上15歳未満:2錠 12歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、発熱、のどの痛み、せき、たん、くしゃみ、悪寒、頭痛、 関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないで下さい。 <ol style="list-style-type: none"> (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3)12歳未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 5. 服用前後は飲酒しないで下さい。 6. 長期連用しないで下さい。 <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人 高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、 緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 <p>【12歳以上のお子様に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

2019.7 作成