

# 医薬品を正しく購入するための 説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ルルアタック FXa
2	成分・分量	6錠中 イソプロピルアンチピリン(ピリン系) 300mg、アセトアミノフェン 450mg、 ショウキョウ末 200mg、クレマスチンフマル酸塩 1.34mg、グリチルリチン酸 39mg、 チペピジンヒベンズ酸塩 75mg、ノスカピン 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、 無水カフェイン 75mg、アスコルビン酸(ビタミン C) 300mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用して下さい。 成人(15歳以上):2錠 7歳以上15歳未満:1錠 7歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、せき、たん、 関節の痛み、筋肉の痛み、くしゃみ)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止す るために必要 な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないで下さい。</p> <p>5. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <p>(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人</p> <p>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(3)授乳中の人</p> <p>(4)高齢者</p> <p>(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(6)次の症状のある人 高熱、排尿困難</p> <p>(7)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、 緑内障</p> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断す る事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

2017.8 作成